



Con un incendio, Yo Muero



Imágenes extraídas de la Guía de Campo editada y publicada por la Corporación Chilena de la Madera: "Fauna de los Bosques Templados de Chile. Guía de Campo de los vertebrados terrestres." de Celis-Diez JL, S Ippi, A Charrier & C Garín (2011).



@altoincendios
 Altoincendiosforestales
www.corma.cl



Chloraea prodigiosa

Rchb. f.

Planta perenne delgada, grácil, de hasta 100 cm de altura. Flores blancas con la nervaduras verde intensas, dibujadas.

Endémica de Chile. Crece en la Región de O'Higgins, en Termas de Cauquenes, Altos de Cantillana, Llanos de La estrella cercanos al embalse Rapel y el interior de Pichilemu y cercanías de Paredones. También en Los Queñes, provincia de Curicó.

Floración: Septiembre a Noviembre.





Chloraea cristata Lindl.

Planta de 30 a 70 cm de alto. Pétalos de 18 - 22 mm de largo por 3 - 4,5 mm de ancho, de color verde o verde amarillento con nervadura marcada verde oscuro.

Endémica de Chile. Crece desde Caleta Sierra en la comuna de Canela, Región de Coquimbo a Algarrobo, región de Valparaíso.

Floración: octubre a noviembre.



Vulnerable.



Chloraea disoides Lindl.

Planta perenne de escasa altura cuando crece expuesta y hasta 25 cm de alto, cuando crece al abrigo de arbustos bajos. Con 5-10 flores erguidas, laxas, verdosas.

Endémica de Chile. Se conocen poblaciones en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar y una población disjunta en las cercanías de Angol y sur de Los Ángeles, existiendo una colecta muy antigua para la zona de Constitución.

Floración: Agosto a Septiembre.





Bipinnula volckmannii Kraenzl.

Planta herbácea con escapo muy delgado de 30 a 50 cm de largo. Hojas inferiores oblongas, agudas atenuadas en la zona de inserción, hojas caulinares envainadoras, distanciadas, agudas. Inflorescencia laxa de 2 a 5 flores, vistosas, verdes.

Endémica de Chile. Crece en la Región del Biobío, en la cordillera de Chillan (Las Trancas, Río Diguillín) y en la cordillera de Nahuelbuta y en la Provincia de Malleco, Región de la Araucanía, entre los 1.500 y 1.800 m s.n.m. Floración: Noviembre a Diciembre.

Floración: Noviembre a Diciembre.



En peligro.



Chloraea cuneata Lindl.

Planta de 40 a 60 cm de altura. Inflorescencia pauciflora, laxa, de flores medianas, vistosas, patentes.

Endémica de Chile. Actualmente se conocen poblaciones en la cordillera de Nahuelbuta, desde el sur de la ciudad de Arauco, Caramávida y P. N. Nahuelbuta hasta en Villa Las Araucarias, 26 km al norte de Carahue. Según Reiche todas las muestras procedían de la provincia de Valdivia, de la localidad de Huequecura, hoy llamada Huequecura entre La Unión y Valdivia. Urge verificar si aún existe dicha población vista por última vez a mediados del siglo XIX.

Floración: Enero.



En peligro crítico.