


■ *Liolaemus buergeri* Werner, 1907

Nombre común: Lagarto de Buerger. *Buerger's lizard*



Etimología: Dedicada al doctor y zoólogo Otto Bürger, quien proporcionó la muestra con que fue descrita la especie.

Reconocimiento: Es de tamaño grande y aspecto fornido, su cola es algo más larga que la longitud hocico cloaca. La cabeza es triangular y deprimida dorsoventralmente al igual que el cuerpo. El cuello está plegado y las extremidades son cortas y poco macizas. Un pliegue lateral levemente insinuado se extiende por los flancos de algunos ejemplares. Las escamas del dorso tienen forma subtriangular, son pequeñas, levemente quilladas, de disposición imbricada y presentan algunos heteronotos. Las del vientre son de mayor tamaño, romboidales, lisas, imbricadas y también presentan pocos heteronotos. Solo el macho puede presentar hasta cuatro poros precloacales vestigiales, poco diferenciados o que casi no se notan. No posee dimorfismo sexual. La coloración del cuerpo es de tono general pardusco claro o grisáceo, existiendo individuos con tonalidades rojizas o amarillentas. En el dorso tiene una banda central oscura acompañada de dos bandas claras. La coloración de los flancos es similar a la zona vertebral y presentan algunas escamas claras aisladas de tonalidades blanquecinas y/o amarillentas. En la zona paravertebral se aprecian manchas negras irregulares transversas que comunican ambos flancos. La cabeza tiene escamas negruzcas dándole un aspecto más oscuro que el resto del cuerpo. Algunos ejemplares presentan anillos en la cola, manchas dispersas o una línea dorsal oscura. El vientre es de color blanquecino con tonalidades amarillentas, rojizas o anaranjadas.

Distribución: Se encuentra en zonas andinas desde el estero Los Humos, en la Región de O'Higgins, hasta la Laguna del Maule, entre 1.800 a 3.000 msnm. Además, presenta registros en El Planchón y en Altos de Lircay. Existen poblaciones atribuibles a esta especie ubicadas en el límite entre las regiones del Maule y del Biobío, en la Laguna Dial y en el Río Cisternas. También está presente en Argentina.

Historia natural: Habita sectores cercanos a cuerpos de agua, aunque también es posible encontrarla en la cordillera en sectores rocosos. Se la puede observar desplazándose rápidamente entre las rocas presentes en las riberas de arroyos y lagunas. Es de reproducción vivípara. Es omnívora, consume vegetales y artrópodos pequeños.

