


■ *Liolaemus ubaghsi* Esquerré, Troncoso-Palcios, Garín & Nuñez, 2014

Nombre común: Lagarto leopardo de Ubaghs. *Ubaghs'leopard lizard*.



Etimología: Dedicada al profesor George Ubaghs (1916 - 2005), paleontólogo belga que estudió equinodermos del Paleozoico, y quien fue el bisabuelo del primer autor de la descripción.

Reconocimiento: El tamaño es grande y el aspecto robusto. La cola alcanza una vez y media el tamaño del cuerpo. La cabeza, más larga que ancha, tiene forma triangular y el cuello es tan ancho o levemente mayor que esta y presenta pliegues bastante desarrollados. Las extremidades son largas y de aspecto robusto. Las escamas dorsales son romboidales, subimbricadas, quilladas, sin mucrón y con presencia de heteronotos. Las escamas del vientre son de tamaño similar a las dorsales, redondeadas, lisas e imbricadas, sin heteronotos. Solo los machos pueden presentar hasta cuatro poros precloacales. El color general del dorso, cabeza, cola y extremidades es café, con los flancos de un café más oscuro. En ocasiones presenta pequeñas manchas negras esparcidas en el dorso a intervalos regulares y algunas escamas solitarias de tonos celestes y blanquecinos. El vientre es amarillento o anaranjado y la región gular blanquizca con manchas oscuras.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de los Andes de Chile central, al Este de Rancagua, en la Región de O'Higgins, entre 1.850 y 2.250 msnm. Hay registros cercanos al Centro de Ski Chapa Verde, Tranque Barahona, Tranque Los Sapos, en las inmediaciones de la Mina El Teniente. Además existiría una población en la parte alta del Parque Nacional Río Clarillo.

Historia natural: Habita sectores cordilleranos rocosos con presencia de vegetación herbácea y arbustiva de baja altura. Durante el invierno se refugia bajo rocas, las que puede compartir con otros ejemplares de la misma especie y de otras especies del género. Su reproducción es vivípara.

