


▣ *Pristidactylus alvaroi* (Donoso-Barros, 1974)

Nombre común: Gruñidor de Álvaro. Alvaro's Lizard. Alvaro's growler.



Etimología: Referido a Álvaro, hijo del herpetólogo Roberto Donoso-Barros.

Reconocimiento: El tamaño es grande y la cola, lateralmente comprimida, puede alcanzar una vez y media la longitud del resto del cuerpo. La cabeza es voluminosa y el iris de color café rojizo. El cuello es fuertemente plegado. Las extremidades son delgadas y largas. Las escamas dorsales son pequeñas, redondeadas, de superficie lisa; presenta una línea vertebral de escamas más prominentes. La coloración de machos y hembras es similar. El color general de fondo es grisáceo. En el dorso presenta manchas redondeadas café rojizas u oscuras, las que se disponen formando hileras transversales. Exhibe una mancha negra alargada en la región antehumeral que se extiende ventralmente, pero sin completarse. Los flancos son de una tonalidad de fondo cafésosa y pueden presentar pequeñas manchas blancas y/o café rojizas. En su cola se aprecia un patrón anillado y su vientre es amarillento.

Distribución: Es endémica de la Cordillera de la Costa de Chile central. Se encuentra en el cerro El Roble, Quebrada Alvarado y Parque Nacional La Campana, en la Región de Valparaíso, y en Altos de Chicauma, en la Región Metropolitana, entre 1.000 y 2.200 msnm.

Historia natural: De hábitos arborícola y saxícola, prefiere bosques de roble *Nothofagus macrocarpa*, aunque también, se le ha visto en lugares con grandes piedras y matorrales, lejos del bosque. Toma el sol sobre troncos y rocas. Se refugia en las cavidades de los árboles y bajo piedras. Reproducción probablemente ovípara. Es insectívora; se desconoce si complementa su dieta con otros alimentos. Al ser manipulada puede ser bastante agresiva y, con su poderosa mordida, desgarrar la piel humana. Es poco frecuente y poco abundante.

