

Lycopodium paniculatum Desv.

LYCOPODIACEAE

Nombres vulgares: Palmita, llanka-lahuén

Hierba perenne con rizoma rastrero, dorsiventral, epígeo, hojoso, clorofílico. Ramas laterales estériles abundantes, separadas por 5 a 10 cm, levantadas, alcanzando 20 a 60 cm o más, un tanto arqueadas y dorsiventrales; ramas laterales fértiles menos abundantes, y por lo común más largas que las estériles, levantadas, no arqueadas, con pocas hojas muy finas. Hojas monomorfas, simples, verdes, delicadas, lineares, dispuestas espiraladamente en las ramas, agudas en el ápice, de alrededor de 5 mm de largo. Estróbilos numerosos (hasta 40), pedunculados, de 4 a 5 cm de largo; pedúnculos bracteosos, de 5 a 10 cm de largo; esporofilos anchamente ovoides, agudos en el ápice, acuminados, margen lacerado.

Caracteres relevantes: Rizoma rastrero, epígeo, hojoso. Ramas abundantes, un tanto arqueadas y dorsiventrales. Estróbilos numerosos, pedunculados, pedúnculos bracteosos, de 5 a 10 cm de largo.

Crece en los bosques subantárticos de Chile y Argentina, en nuestro país se encuentra desde la provincia de Concepción hasta la Región de Aisén, entre los 15 a 1.300 m de altitud. Se encuentra dentro del bosque y con sus largos rizomas suele apoyarse en las ramas de los arbustos.

Estado de conservación: Vulnerable.



Amenazado

