

Buteo polyosoma


Aguilucho común, *ñamku*, *ñancu*



Orden: Accipitriformes

Familia: Accipitridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Arica hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** cosmopolita.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** sin clasificar.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** no presenta amenazas inmediatas, sin embargo son susceptibles a la pérdida y degradación del hábitat y a la disminución de su alimento en algunas áreas. Caza ilegal, pues se cree que consumen aves de corral.



Descripción e historia natural: hermosa rapaz, común en todo Chile. La coloración más común consta de cabeza y alas grises, pecho blanco y franja negra subterminal en la cola, que se aprecia fácilmente en vuelo. La hembra es de mayor tamaño que el macho y tiene el lomo rojizo, mientras que el macho lo tiene de un color gris azulado. En esta especie se han descrito varios morfos diferentes y además, los juveniles expresan diferentes fases de coloración hasta llegar al plumaje adulto, dificultando su identificación. De hábito diurno, el aguilucho es bastante oportunista y una de sus principales presas es el ratón colilarga, que es el principal transmisor del virus Hanta. También consume aves, insectos y pequeños reptiles que caza tirándose en picada. Su nido es una plataforma grande de palitos y ramas que ubica en ramas gruesas de árboles, en cactus grandes o incluso en rocas o postes de luz. Nidifica durante la primavera y pone de uno a tres huevos de color blanco grisáceo, con manchitas pardas.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** en la actualidad se encuentra prohibida su caza, captura y tenencia, por lo que se debe fiscalizar y cumplir la Ley de Caza. Fomentar iniciativas de educación ambiental.