

Pleurodema bufoninum


Sapo de cuatro ojos del sur



Orden: Anura

Familia: Leiuperidae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** en la Cordillera de los Andes desde la Laguna del Maule en la Región del Maule, hasta Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** pequeñas quebradas y riachuelos. También en zonas anegadas o pequeñas lagunas y en ambiente alto andinos y tundra magallánica.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat. Remoción de vegetación ribereña. Introducción de peces no nativos (salmónidos). Canalización y embalses de cuerpos de aguas.



Descripción e historia natural: anfibio de tamaño pequeño de piel lisa con pequeñas rugosidades. Posee una coloración dorsal gris oscuro o ceniciento con manchas en la espalda. Puede presentar estrías de coloración amarillo verdoso sobre el dorso y blanco grisáceo hacia el vientre. Posee glándulas lumbares alargadas y ovaladas en la parte posterior del cuerpo, de coloración grisácea que parecen dos grandes ojos, mayores que las de sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*). Extremidades cortas y finas. Dedos de patas traseras sin membrana interdigital. Tímpano visible externamente. De hábito nocturno, durante el día se refugia bajo rocas o en la vegetación circundante a los cursos de aguas. Durante la época reproductiva el macho llama a la hembra desde el agua. La ovipostura es en forma de racimo y es dejada en charcos temporales o lagunas poco profundas entre la vegetación acuática. La larva es de vida libre y se desarrolla en aguas lénticas.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo, especialmente la vegetación ribereña. Conservar cuerpos de agua y evitar su modificación (por ejemplo represas). Evitar la introducción de peces exóticos. Fomentar iniciativas de educación ambiental.