

Buteo ventralis


Aguilucho de cola rojiza



Orden: Falconiformes

Familia: Accipitridae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Talca en la Región del Maule hasta la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, pero extiende su área de caza al ecotono y áreas abiertas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Rara.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo, particularmente por la disminución de número de árboles grandes necesarios para construir su nido. Cebos envenenados y trampas para carnívoros. Caza ilegal, pues se cree que consumen aves de corral.



Descripción e historia natural: el aguilucho de cola rojiza, como muchas otras rapaces, presenta diferencias de tamaño entre sexos, siendo los machos (1,0 – 1,2 kg) más pequeños que las hembras (1,4 – 1,7 kg). La cabeza y el dorso son negro parduzco, con el pecho y abdomen con estrías verticales pardas sobre blanco, y cola de color rojizo con bandas transversales negras. También tienen una fase oscura, en la cual son de color pardo negruzco. Es un depredador generalista, que se alimenta principalmente de aves (loicas y torcazas), en menor medida de mamíferos (roedores y conejos), y en mucha menor proporción de reptiles e insectos. Para nidificar construye gruesas plataformas de ramas, de 1 m de diámetro, colocadas en árboles grandes de más de 25 m de altura. La postura de huevos ocurriría entre octubre y noviembre, mientras que los polluelos abandonarían el nido durante enero. Se han descrito desde uno a tres polluelos por nido.

▶ **Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y la presencia de árboles antiguos y/o grandes. En la actualidad se encuentra prohibida su caza, captura y tenencia, por lo que se debe fiscalizar y cumplir la Ley de Caza. Fomentar iniciativas de educación ambiental.