

# *Eupsophus roseus*


Sapo rojo



**Orden:** Anura

**Familia:** Cycloramphidae

- ▶ **Origen:** endémico.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Cautín en la Región de La Araucanía hasta la Provincia de Valdivia en la Región de Los Ríos.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo, especialmente en pequeños cuerpos de agua en bosques de *Nothofagus*. También en zonas inundadas como mallines y turberas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Remoción de vegetación ribereña. Desecación de humedales para plantaciones forestales con especies exóticas y extracción no sustentable de pompon en turberas. Incendios forestales.



**Descripción e historia natural:** anfibio de tamaño mediano. De coloración muy variable con predominancia de tonos rojizo anaranjado o rosado pálido, con manchas irregulares. Piel lisa sin granulaciones. Estrías anchas, negras e irregulares cruzan ambos lados del cuerpo desde la parte superior del ojo hasta los costados. Brazos finos y cortos. Patas traseras gruesas con dedos largos sin membrana interdigital. Pupila horizontal negra con característico borde ocular superior dorado. De actividad nocturna, se esconde bajo troncos caídos, rocas y hojarasca durante el día. Durante la época reproductiva el macho llama a la hembra desde pequeñas cavidades naturales en zonas pantanosas. Ponen entre 53 y 206 huevos de coloración crema. Las larvas se desarrollan en zonas inundadas y poseen una coloración amarilla o blanca. Al no tener pigmentación son muy sensibles a la luz, por lo que permanecen ocultas durante todo su desarrollo.

**Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo y los humedales. Fomentar iniciativas de educación ambiental.