

Batrachyla taeniata


Rana de ceja, ranita de antifaz



Orden: Anura

Familia: Ceratophryidae

- ▶ **Origen:** endémico de los bosques templados australes de Chile y Argentina.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Región de Valparaíso hasta Puerto Natales en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo y zonas inundadas como pomponales.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule. Vulnerable desde la Región del Bío Bío a la Región de Los Lagos.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Remoción de vegetación ribereña. Desecación de humedales para plantaciones forestales con especies exóticas y extracción no sustentable de pompon en turberas. Incendios forestales.



Descripción e historia natural: es un anfibio de tamaño pequeño, esbelto y acinturado, con una cabeza larga y puntiaguda. De brazos y piernas finas y largos dedos en manos y pies, sin membrana interdigital. La coloración del cuerpo puede variar entre el café oscuro y el rosado pálido, dependiendo del sustrato y de la temperatura ambiental. Dos largas estrías negras cruzan desde las fosas nasales por delante de los ojos hasta los hombros. Habita predominantemente bosques, turberas y zonas inundadas y es posible verlo de día caminando y saltando por el bosque. Usa como guaridas orificios dejados por una serie de otros animales que conviven en el mismo hábitat. También es posible encontrarlo bajo rocas o refugios de troncos y cortezas o sobre musgos o en lechos de ríos, cantando sobre las rocas descubiertas durante la noche.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo y los humedales. Realizar explotación sustentable de pompon. Proteger la vegetación de quebradas y riberas. Fomentar iniciativas de educación ambiental.