

# *Liolaemus schroederi*


Lagartija de Schröder



**Orden:** Squamata

**Familia:** Tropiduridae

- ▶ **Origen:** nativo.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** desde la Provincia de Quillota en la Región de Valparaíso hasta la Cordillera de Nahuelbuta en la Región de La Araucanía. Desde 200 a 2200 msnm.
- ▶ **Hábitat:** bosques y matorrales nativos en la precordillera de la Cordillera de La Costa y de Los Andes. También presente en zonas rurales y plantaciones forestales.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** Insuficientemente Conocido.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del hábitat, aunque se adapta relativamente bien en ambientes modificados por el hombre.



**Descripción e historia natural:** lagartija de tamaño mediano (puede medir entre 19 y 23 cm) y de aspecto grácil, cola más del doble de la longitud hocico-cloaca. Escamas dorsales triangulares alargadas, imbricadas y muy quilladas, terminadas en pequeña punta. Diseño dorsal formado por dos líneas supraoculares grisáceo claro o amarillento muy bien definidas, que recorren el dorso longitudinalmente hasta difuminarse con el color de la cola. Entre ambas líneas una banda medio dorsal café verdoso o parduzco, sobre la que se disponen dos series de manchas negras triangulares que bordean las bandas supraoculares, sobreponiéndose a éstas levemente. Especie muy versátil, se encuentra asociada a ambientes en un amplio rango altitudinal, desde formaciones rocosas y de matorral costero hasta matorral bajo precordillerano. En la mitad sur de su distribución es un frecuente habitante del sotobosque y de plantaciones forestales. Su dieta se encuentra constituida por pequeños artrópodos y su reproducción es vivípara.

**Medidas de manejo para su conservación:** conservar el bosque nativo, especialmente el sotobosque. Mantener sotobosque en plantaciones forestales. Fomentar corredores de vegetación nativa en zonas rurales y ambientes urbanizados. Fomentar iniciativas de educación ambiental.