

Eupsophus migueli


Sapo de Miguel



Orden: Anura

Familia: Cycloramphidae

- ▶ **Origen:** endémico.
- ▶ **Distribución de la especie en Chile:** restringido a la Cordillera de la Costa en la Provincia de Valdivia: Mehuin, Los Molinos y San José de la Mariquina, en la Región de Los Ríos. Entre los 50 y los 300 msnm.
- ▶ **Hábitat:** bosque nativo de la Cordillera de la Costa, especialmente bosques antiguos en pequeñas quebradas y esteros. También en zonas inundadas.
- ▶ **Estado de conservación en Chile:** En Peligro y Rara.
- ▶ **Amenazas a su conservación:** pérdida y degradación del bosque nativo. Remoción de vegetación de quebradas y ribereña. Distribución restringida.



Descripción e historia natural: anfibio de tamaño pequeño y estilizado, de piel lisa. Hocico suavemente aguzado. Coloración del dorso café grisáceo. Coloración lateral y extremidades, café grisáceo con manchas difusas de coloración amarilla o blanquecina. Algunos ejemplares pueden presentar una línea vertebral hoccico-cloaca. Habita en zonas húmedas del bosque refugiado bajo troncos caídos, rocas y hojarasca. Durante las noches es posible encontrarlo sobre piedras en las inmediaciones de esteros correntosos. Reproducción desde noviembre y durante todo el verano.

Medidas de manejo para su conservación: conservar el bosque nativo de la Cordillera de la Costa de la Región de Los Ríos. Proteger los bosques antiguos, vegetación de quebradas y el sotobosque. Fomentar estudios científicos y monitoreos. Evitar tala rasa. Fomentar iniciativas de educación ambiental.