


Eryngium paniculatum

Cav. et Domb. ex Delar.

Chupalla, chagualillo

Floración: 

Fructificación: 

Familia: Apiáceas (Umbelíferas).

Origen geográfico: Nativa de Chile, Argentina y Brasil.

Distribución en Chile: En casi todo el territorio del país.

Descripción: Hierba perenne de porte arbustivo. Hojas duras, persistentes, dispuestas en una roseta basal, linear-lanceoladas, dentadas, dientes con pequeñas espinitas no punzantes; las de la inflorescencia, alternas y menores. Inflorescencia en glomérulos densos, dispuestos sobre un pedúnculo de hasta 1,5 m de altura. Flores sésiles, cáliz con sépalos prominentes, corola con 5 pétalos blancos, lanceolados, con el ápice bilobulado, gineceo con ovario ínfero, con los estilos largos. Florece a comienzos de primavera. Fruto un aquenio normalmente cubierto por escamas parecidas a hojas, madura en verano.

Hábitat: Crece en suelos degradados a pleno sol o en condiciones de semisombra. Tolera sequía y nieve y puede crecer en pendientes pronunciadas.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño, en almácigo estratificado.

Utilización: Se planta en las laderas para ayudar a estabilizarlas, también en el margen de los senderos donde se ubica hacia el lado del declive y en rocallas, al borde de terrenos aterrazados. Las varas florales sirven para hacer arreglos decorativos de larga duración.



