

Baccharis obovata

Hook. et Arn.

Chilca

Floración:   **Fructificación:**  

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Aysén.

Descripción: Arbusto erguido, de hasta 3 m de altura por el mismo diámetro. Ramaje abundante que porta hojas densas. Hojas obovado-lanceoladas, de 1-3 x 0,5-1,6 mm, dentadas 1/3 o 2/3 o sólo en el ápice. Capítulos florales de color marfileño, pedunculados, dispuestos en falsas umbelas terminales. Florece desde fines de la primavera hasta fines del verano. Fruto, un aquenio con vilano de pelos blancos, que madura en verano y otoño.

Hábitat: Crece entre otros arbustos, en claros del bosque, a pleno sol, en suelos con buen drenaje. Bosque montano hasta el matorral subandino.

Propagación: Se propaga por semillas que se disponen en otoño en almácigo estratificado. Vegetativamente se multiplica mediante estacas a las que se les aplican hormonas para que arraiguen.

Utilización: Usar como un arbusto pionero, plantándolo en terrenos degradados en laderas o como planta para rocalla, donde lucirá su follaje denso y sus abundantes capítulos florales.



