

# Baccharis racemosa

(Ruiz et Pav.) Pers.

Chilca

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Asteráceas (Compuestas).

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones de Valparaíso a la de Los Lagos.

**Descripción:** Arbusto, de hasta 4 m de altura por 3 m de diámetro, apenas erguido o apoyante; ramas largas y ásperas. Hojas glandulosas, sésiles, aovado-lanceoladas, de 6 cm de longitud, dentadas y las nervaduras muy marcadas. Capítulos en racimos terminales; florecen a principios de verano. Fruto, un aquenio con un vilano de pelos blancos, madura a fines del verano y en otoño.

**Hábitat:** Crece en claros del bosque o en sus márgenes, en suelos ricos en materia orgánica, con algo de humedad. Es parte del bosque esclerófilo y de los bosques de *Nothofagus obliqua* (roble).

**Propagación:** Se propaga mediante semillas, las que se siembran en un almácigo estratificado durante el otoño; se plantan con el vilano para no dañar los embriones. Se multiplica vegetativamente en invierno mediante estacas tratadas 1-2 días con hormonas para que arraiguen.

**Utilización:** Se planta solitario o en grupos con otros arbustos, en los jardines se utiliza para iluminar con sus capítulos plateados en otoño rincones oscuros. En medicina alternativa se utiliza en cataplasma, contra el reumatismo y en infusión, como purgante.



