

Chiliotrichum diffusum

(G. Forst.) Kuntze

(Se incluye a *Ch. rosmarinifolius* Less.)

Romerillo, mata negra fueguina

Floración:



Fructificación:



Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile y Argentina.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Magallanes.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 1,5 m de altura por 1 m de diámetro, muy ramificado, ramas erectas, tomentosas cuando nuevas y de color grisáceo a la madurez. Hojas coriáceas, lanceolado-oblongas o aovadas, cuneadas en la base, cortamente mucronadas en el ápice, con los bordes revolutos y enteros. Las inflorescencias son capítulos solitarios, con las lígulas blancas y las flores centrales tubulares, amarillas. Florece en verano. El fruto es un aquenio alargado con vilano de pelos de color amarillento, madura en otoño.

Hábitat: Crece en sitios abiertos, bien iluminados. Es parte de los matorrales subandinos.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas durante el otoño en almácigo estratificado. De modo vegetativo se multiplica por esquejes, en cama fría, durante el verano.

Utilización: Se planta en jardín como arbusto floral aislado o como parte de macizos arbustivos. Crece muy bien en rincones húmedos, o en las orillas de los cursos de agua siempre que el suelo se drene. Puede ser cultivado en macetas grandes.



