

b. *Alstroemeria hookeri* Lodd. subsp. *maculata*
Ehr. Bayer

» Ehr. Bayer, Mitt. Bot. Staatssamml. München 24: 153. 1987. TIPO: Chile, Región de Coquimbo, Provincia de Choapa, etwas nördlich von Los Vilos, Panamericana Norte km 235,5, 19.11.1981, Bayer 386 (Holotipo: M).

Descripción: Se distingue de la subespecie típica por las hojas de los tallos estériles más largas (3,2-9 cm de largo), por tener el tépalo interno inferior siempre provisto de manchas atropurpúreas y por tener los tépalos largamente mucronados. Hierbas perennes de hasta 50 cm de alto con flores rosado pálidas o de un color más intenso. Para una descripción detallada véase Bayer (1987).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Restringida a la Región de Coquimbo. Ha sido recolectada únicamente al norte de Los Vilos (31°48'S – 31°55'S) y entre el nivel del mar y los 140 m s.n.m., en suelo arenoso.

Observaciones: Esta subespecie fue descrita por Bayer (1987) basándose en plantas recolectadas por ella misma (Bayer 386, 1100) al norte de Los Vilos. Además, menciona entre los ejemplares estudiados un espécimen recolectado en 1963 por F. Behn s.n. en Los Molles (CONC 34044), pero éste corresponde a *A. cummingiana*.

Estado de conservación: Vulnerable (Hoffmann *et al.* 2015).

