

# *Chilesia rudis*

(Butler, 1882)

Cuncuna colorada

Orden: **Lepidoptera**

Familia: **Arctiidae**



## Descripción General

Los machos son de aspecto robusto, de color castaño oscuro tendiendo a terracota. El borde de las alas es redondeado, las alas posteriores son más claras especialmente hacia la base; en ambos pares no existen marcas distinguibles. El cuerpo está cubierto de pelo abundante y largo lo que da un aspecto robusto, el tórax es notablemente más largo, de color castaño rojizo, más oscuro en la parte anterior, la parte dorsal del abdomen es castaño amarillento y los costados, ocre. Las antenas son de color similar a las alas anteriores. Las patas del mismo color del resto del cuerpo, están densamente cubiertas de pelo color castaño rojizo y amarillentos. Adultos de ambos sexos son similares en color y tamaño. La hembra tiene alas reducidas; abdomen cubierto de pelos amarillos, existe un mechón anal blanco amarillento. Patas cubierta de pelos ligeramente amarillentos. La hembra tiene las alas reducidas no aptas para el vuelo. Cada hembra pone hasta 600 huevos redondeados, globosos blanco amarillentos, de 0,8 mm de diámetro y 0,7 mm de alto aproximadamente, entre las champas de pasto, pegados a ramillas de arbustos y árboles y en tallo de algunas gramíneas.

## Hábitat y rol trófico

Las larvas son fitófagas y consumen hojas y brotes de distintos vegetales. Las larvas pasan sus primeros estadios en el pasto, luego son de aspecto robusto debido a la abundante cubiertas de pelos. Su longitud varía entre 30 y 40 mm llegando en algunos casos a 45 mm, el ancho máximo es de 5 a 6 mm, la cabeza es negra brillante igual que las patas.

