

Praocis marginata

Germain, 1855

Orden: Coleoptera
Familia: Tenebrionidae



Descripción General

La descripción solo se refiere a machos, la hembra es desconocida. Su longitud 7.0-8.1 mm. Cabeza, tórax y élitros negro, esternitos, fémures y tibias negro a marrón oscuro, antenas y tarsos marrón oscuro. Cabeza con clípeo y frente con perforaciones redondas, cada una con una seta central; antenas llegando a 3/4 largo del margen lateral del pronoto; antenómero 9 más largo que ancho, con cuerpo sensorial apical, parches dispuestos en dos áreas separadas dorsalmente; antenómero 10 tan ancho como antenómero 11. El Tórax con pronoto más ancho detrás del punto medio; disco y los cuartos laterales glabros; élitros con pequeños puntos, ancho de margen anterior no superior a la mitad de la anchura del margen posterior; cuartas partes laterales superficie convexa, de margen lateral dorsal teniendo una fila de cerdas cortas cobrizas. Proesterno horizontal, con pinchazos en el borde en el margen anterior ampliado por debajo de gula; proceso prosternal producido hacia atrás, superando el punto medio de la espacio entre pro y mesocoxas. Élitro con carina proxima al margen lateral de sutura, con una ranura ancha sobre el margen lateral, ocupando tercio exterior de élitros, superficie dorsal glabra, con punteaduras; pseudo y epipleura glabra, que carecen de protuberancias o perforaciones. Patas con superficie ventral del meso y metafémures que carecen de una hilera de pelos en el borde. La superficie interior de meso y metatibia con pelos cortos y robustos. Metatibia recta.

Hábitat y rol trófico

Son diurnos y se les puede observar caminando o bajo piedras y plantas.

Se tiene poca información de su ontogénia, presenta poca densidad poblacional y distribución muy restringida.

